

*ABSTRACT*

*THEME: Study of some determinants of behaviors of health of the children from 0 to 35 months in Cameroun and poverty*

*Written by SIELENOU TEMA AUDREY*

*E-mail : [chasles20@yahoo.fr](mailto:chasles20@yahoo.fr) or [tema\\_francklin@hotmail.com](mailto:tema_francklin@hotmail.com)*

Le Cameroun a traversé entre la fin des années 1980 et le milieu des années 90 une récession économique provoquée par la chute des cours mondiaux des matières premières et des principaux produits agricoles d'exportation. Cette crise a entraîné la détérioration des conditions de vie des populations en ville comme en campagne avec des effets négatifs directs sur la santé. En effet, d'après les résultats de la troisième Enquête Démographique et de Santé du Cameroun (EDSC III) réalisée en 2004, la situation sanitaire est encore marquée par des taux élevés de mortalité infantile (45‰) et juvénile (29‰), imputables aux maladies infectieuses et parasitaires. La situation vécue actuellement au Cameroun peut être expliquée d'une part par le contexte socio-économique difficile que traverse toujours le pays, et d'autre part par la faible couverture globale du pays en infrastructures sanitaires.

Face à cet état de choses, il y a lieu de s'interroger sur les liens possibles entre le phénomène de pauvreté et l'état de santé des individus, des enfants de moins de trois ans en particulier. Nous nous proposons dans ce travail d'étudier, sur la base des données de la deuxième Enquête Camerounaise auprès de Ménages (ECAM II) réalisée en 2001, la relation entre le niveau de vie des ménages et la santé des enfants âgés de 0 à 35 mois au Cameroun.

Il découle de cet objectif général, deux objectifs spécifiques, à savoir: mesurer et analyser au moyen des données de l'ECAM II l'état de santé des enfants en rapport avec le niveau de vie des ménages; identifier les variables pertinentes dans l'explication de l'état de santé des enfants âgés de 0 à 35 mois.

Pour atteindre notre objectif la méthodologie retenue sera de faire usage du modèle logistique afin de modéliser la relation entre l'état de santé des enfants et les principales variables pertinentes qui permettent d'expliquer cet état de santé. Les données exploitées dans le cadre de cette étude proviennent essentiellement de la deuxième Enquête Camerounaise auprès des Ménages (ECAM II) réalisée de septembre à décembre 2001.

Les résultats suggèrent comme principaux déterminants de la santé des enfants de la tranche d'âge étudiée : (i) le niveau de vie des ménages; (ii) l'éducation

des parents, notamment de la mère ; (iii) localisation géographique des ménages ; (iv) facteurs communautaires.

Des mesures particulièrement vigoureuses devront être mises en œuvre pour d'une part induire, au sein des populations, l'adoption de comportements favorables à la santé et d'autre part lever les contraintes qui pèsent sur la demande des soins de santé. Il faudra aussi chercher à pallier les insuffisances du système de santé dans la provision de soins de qualité aux populations en générale et les plus pauvres en particulier.